

財團法人台灣香蕉研究所

函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號
承辦人：蘇慶昌
電話：(08)7392111~3
傳真：(08)7390595
E-mail：succcc@yahoo.com.tw

受文者：花蓮縣政府
發文日期：中華民國 104 年 12 月 9 日
發文字號：(104)台蕉研發字第 2669 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：蕉株抽穗期間，籲請 蕉農務必適時做好花薊馬防治作業，俾確保生產外觀優良品質，請 查照。

說明：

- 一、香蕉花薊馬於此時期易於生長繁殖，尤以種植‘寶島蕉’(新北蕉)及‘台蕉 7 號’(玉泉)兩品種且逢蕉株抽穗蕉園者為甚。倘若香蕉花苞抽出莖頂，尚未彎曲前疏忽花薊馬防治，易導致花薊馬侵入花苞，在香蕉幼果果皮上產卵及剝吸汁液，造成果皮外表出現許多卵斑及水銹疤痕，影響香蕉外觀品質至鉅。務請蕉農把握防治時機，及時進行田間花薊馬防治作業。
- 二、防治方法：每 3-5 天巡視蕉園 1 次，在花苞抽出莖頂前期或初彎前，選擇下列一種藥劑配方防治：
 - 1、以 2.8%第滅寧乳劑 3,000 倍液，噴施剛抽出莖頂或初彎下花苞，每隔 5 天噴施 1 次，共噴 3 次。
 - 2、5 %陶斯松粒劑或 10 %福瑞松粒劑：每株 15 公克，分別撒施於第 1、2 葉鞘內，並於終花期前以 2.8 %第滅寧乳劑 3,000 倍液噴果房 1 次。
 - 3、終花後切除花苞，減少蕉園花薊馬密度。
 - 4、定期防除蕉園雜草，避免花薊馬滋生擴散



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

台灣香蕉研究所病蟲害預測中心

所長趙治平

花府

104/12/10



1040242140